

	Auto questionnaire pour les patients demandant un bilan de dépistage d'IST		Référence : ENR-R/ACC-06
	Yanick HAZAN 05/9/25	Yossi HAZAN 05/09/25	Yanick HAZAN 06/09/25

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

1. Avez-vous des symptômes d'infections sexuellement transmissibles (IST) ?

☐ Oui ☐ Non

Les symptômes les plus fréquents lors des IST sont :

- des douleurs lorsque vous urinez
- des douleurs au niveau du bas du ventre et/ou des saignements vaginaux inhabituels
- des sécrétions vaginales inhabituelles et/ou malodorantes
- des écoulements visibles provenant du pénis
- une douleur soudaine dans les testicules
- des lésions, plaies ou boutons au niveau des parties génitales ou anales

2. Avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois ou souhaitez-vous arrêter le préservatif avec votre nouveau ou nouvelle partenaire ?

☐ Oui ☐ Non

3. Votre partenaire a-t-il été testé positif à une ou plusieurs infections sexuellement transmissibles (chlamydia, gonocoque, syphilis) ?

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Si une de vos réponses aux questions 1, 2 et 3 est oui ou je ne sais pas : vous nécessitez un dépistage de plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST) par une prise de sang et un prélèvement au niveau des parties génitales (auto-prélèvement vaginal ou urinaire), et/ou de l'anus et/ou de la gorge.

4. Avez-vous eu des rapports anaux non protégés par un préservatif ?

☐ Oui ☐ Non

Si vous avez répondu « oui » à cette question, vous nécessitez un prélèvement au niveau anal. Celui-ci est réalisé par auto-prélèvement, merci de passer à la question suivante.

5. Avez-vous eu des rapports oro-génitaux ou oro-anaux non protégés par un préservatif (fellation, cunnilingus, anulingus) ?

☐ Oui ☐ Non

Si vous avez répondu « oui » à cette question, vous nécessitez un prélèvement au niveau de la gorge. Celui-ci est réalisé par auto-prélèvement.

6. Etes-vous vacciné contre l'hépatite B ?

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Si vous avez répondu « non » ou « je ne sais pas » à cette question, nous vous proposons un dépistage de l'hépatite B réalisé par une prise de sang.